

RAS Pflanzenschutz - Empfehlung Mais 2016

(Diese Arbeitsunterlage erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine Gewähr oder Haftung für das Gelingen der Kultur können wir nicht übernehmen.)
(Beachten Sie die Gebrauchsanweisung der Hersteller!)

Vorauflauf

**Gardo Gold 3,0 l/ha
oder Spectrum Gold 2,0l/ha**

Problemstandorte
mit Borstenhirse u.
Hühnerhirse

**Laudis Aspekt + Buctril 2,0 l + 1,5 l + 0,3 l/ha oder
Agravis Laudis + Spectrum + Buctril 2,0 l + 2,0 l + 0,3 l/ha**
(jeweils bessere Wirkungsgrade durch Anwendung im Splitting)

Spritzfolge mit
Acker u. Zaunwinde

Laudis Aspekt + Buctril 2,0 l + 1,5 l + 0,3 l/ha

**Casper Plus* 0,25 kg + 0,25 l/ha oder
Arrat* + Dash EC 0,2 kg + 1,0 l/ha**

Problemstandorte
Storchenschnabel

**Spectrum Gold 2,0 l/ha
im Vorauflauf**

Maister Power 1,5 l/ha

Breite Mischverun-
karutung + Quecke

Spectrum Gold Triple Pack 2,0 l + 0,8 + 0,8 l/ha
Nicosulfuronaufgabe beachten!

Nachspritzung und
Moorstandort

**Laudis 2,0 l + Buctril 0,4 l/ha oder
Milagro Forte Extra Peak 0,5 l/ha + 20 g/ha**
Nicosulfuronaufgabe beachten!

* Zulassungsaufgaben beachten!

- Wachsschicht erforderlich!
- Anwendungsbereich:
- Tagtemp. > 20 - 28 °C
- Nachttemp. > 12 °C

0

10

11

12

14

16

Entwicklungsstadien nach BBCH

